

# Advil

Advil (ibuprofen) là một loại thuốc dùng để chống viêm, không có steroid. Ibuprofen làm giảm các hormone gây viêm và đau trong cơ thể. Advil được sử dụng để hạ sốt, giảm đau hoặc viêm do đau đầu, đau răng, đau lưng, viêm khớp, đau bụng kinh hoặc các chấn thương nhẹ. Advil được sử dụng cho người lớn và trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên.

## Thông tin quan trọng

Advil có thể làm tăng nguy cơ đau tim, gây tử vong hoặc đột quỵ nếu bạn sử dụng thuốc lâu dài, dùng với liều lượng cao, hoặc đã có tiền sử bệnh tim. Không nên sử dụng Advil trước hoặc sau khi phẫu thuật tim. Advil cũng có thể gây chảy máu dạ dày, ruột, gây tử vong, đặc biệt ở người lớn tuổi. Tham khảo ý kiến Bác Sĩ hoặc Dược Sĩ trước khi dùng thuốc này nếu bạn có các bệnh sau:

- Bệnh tim, huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường, hoặc nếu bạn hút thuốc.
- Tiền sử đau tim, đột quỵ hoặc bệnh máu đông cục.
- Tiền sử loét hoặc chảy máu dạ dày.
- Bệnh hen suyễn.
- Bệnh gan hoặc thận.
- Dùng Advil trong 3 tháng cuối của thai kỳ có thể gây hại cho thai nhi.

## Tác dụng phụ của Advil

Phải đi đến các cơ quan y tế để nhờ sự giúp đỡ nếu bạn có các dấu hiệu dưới đây sau khi dùng thuốc:

- Hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, thở khò khè, khó thở, nổi mề đay, sưng mắt, môi, lưỡi, cổ họng.

- Có dấu hiệu của cơn đau tim, đột quỵ như: đau ngực lan đến hàm hoặc vai, đột ngột tê hoặc yếu một bên cơ thể, nói lắp, phù chân, cảm thấy khó thở.

Ngừng sử dụng Advil và gọi Bác Sĩ nếu bạn có những biểu hiện:

- Thay đổi trong tầm nhìn.
- Khó thở (ngay cả khi thở nhẹ).
- Sưng hoặc tăng cân nhanh chóng.
- Dấu hiệu da phát ban.
- Dấu hiệu chảy máu dạ dày - phân có máu hoặc màu hắc ín, ho ra máu hoặc chất nôn trông giống như bã cà phê.
- Các vấn đề về gan: buồn nôn, đau bụng trên, ngứa, cảm giác mệt mỏi, các triệu chứng giống cúm, chán ăn, nước tiểu sẫm màu, phân màu đất sét, vàng da.
- Vấn đề về thận: đi tiểu ít hoặc không đi tiểu, tiểu đau hoặc khó khăn, sưng bàn chân hoặc mắt cá chân, cảm thấy mệt mỏi hoặc khó thở.
- Tế bào hồng cầu thấp (thiếu máu): da nhợt nhạt, cảm thấy choáng váng hoặc khó thở, nhịp tim đập nhanh, khó tập trung.
- Sốt, đau họng, sưng tấy ở mắt hoặc mũi, nóng rát ở mắt, đau da sau đó phát ban da đỏ hoặc tím lan rộng (đặc biệt là ở mặt hoặc phần trên cơ thể) và gây phỏng rộp và bong tróc.

Các tác dụng phụ khi dùng Advil bao gồm:

- Khó chịu ở dạ dày, ợ chua nhẹ, buồn nôn, nôn mửa.
- Đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, táo bón.
- Chóng mặt, nhức đầu, căng thẳng.
- Ngứa nhẹ hoặc phát ban, ù tai.